



# 33 REUNIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA Y PATOLOGÍA MAMARIA DE LA S.E.G.O.

3-5 NOVIEMBRE 2016  
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN



## CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER DE MAMA EN FUNCIÓN DE LA CLÍNICA INICIAL

**Autores:** NOGUERO MR, DE MATÍAS M, CUESTA AB, FERNÁNDEZ R, ABREU E, RODRIGUEZ ZAMBRANO MA  
Hospital Universitario REY JUAN CARLOS (Madrid)


### OBJETIVOS

Analizar las características clínicas y quirúrgicas del cancer de mama según la clínica al diagnóstico

### MATERIAL Y MÉTODOS

Desde marzo de 2012, hasta diciembre de 2015 se han diagnosticado y tratado 338 pacientes con cáncer de mama  
La mediana de edad fue de 58 años (Rango: 20-94)

## RESULTADOS



Edad media: 58,83 IC 95%: 57,23 – 60,4

### EDAD


El motivo de consulta más frecuente fue la presencia de un nódulo palpable: 63,7 % en < 50 años, 52,3 % en ≥ 50, así como en las ≥ de 70 años (89,9 %) (p=0,0001)

### MULTIFOCALIDAD




Se presentó en el 25,7 % de los radiológicos, frente al 13,6% de los palpables (p= 0,006)

### QTP NEOADYUVANTE

El 19,8 % de las pacientes con nódulo palpable fueron candidatas a QTNA, frente al 2,1 % de los hallazgo mamográficos.



Cánceres de mama inicialmente mamográficos (p=0,0001)



### APLICACIÓN CRITERIOS ACOSOG

SUBTIPO	%
Radiológico	56,8
Palpable	39,3

Se aplicaron los criterios de ACOSOG en tumores No palpables con frecuencia significativamente mayor (p=0,005)

### CONCLUSIONES:

El cáncer de mama radiológico al diagnóstico corresponde a un TNM inferior al clínico, y es subsidiario en mayor proporción de Cirugía Conservadora y BSGC



Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Comunidad de Madrid

