



33

REUNIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA Y PATOLOGÍA MAMARIA DE LA S.E.G.O.

3-5 NOVIEMBRE 2016
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN



TUMOR PHYLLODES GIGANTE DE MAMA CON ÁREAS DE OSTEOSARCOMA

Autores: NOGUERO MR, DE MATÍAS M, CUESTA AB, BANCALARI E, MARTÍN R, RAMÍREZ JR
Hospital Universitario REY JUAN CARLOS (Madrid)

OBJETIVOS

Presentación de un caso de tumor Phyllodes gigante con áreas de Osteosarcoma

MATERIAL Y MÉTODOS

El tumor Phyllodes de mama es poco frecuente y se engloba dentro de los tumores fibroepiteliales de mama, con un amplio abanico de presentación clínica y comportamiento biológico. Los malignos son subsidiarios de tratamiento quirúrgico y adyuvante con Radioterapia

Presentamos por su rareza, el caso de una paciente con tumor en mama dcha diagnosticado de Tumor Phyllodes con áreas de osteosarcoma, que alcanzó un tamaño mayor de 20 cms.


Se evalúan características clínicas, tamaño de la lesión, diagnóstico mamográfico, resultado del estudio anatomopatológico y tratamiento

RESULTADOS

Paciente de 56 años de edad, que consultó inicialmente en Septiembre de 2015 por una tumoración en mama dcha de unos 8 cms de diámetro, de tamaño creciente en los últimos meses.




Tras la realización de **PRUEBAS DE IMAGEN** (Eco de mama y Mamografía), y la **PUNCIÓN DIAGNÓSTICA**, se confirmó que ese trataba de un tumor Phyllodes y se estableció la indicación quirúrgica, que la paciente demoró por motivos familiares durante casi un año

Finalmente cuando accedió a la cirugía, la tumoración medía unos 20 cms de diámetro mayor, y confería una asimetría mamaria, duplicando el tamaño de la mama afecta. La paciente refería dolor e inflamación durante las dos-tres últimas semanas en dicha mama, motivo por el cual había seguido tratamiento antibiótico.



En **LA INTERVENCIÓN CON CARÁCTER DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO**, se realizó una incisión con un patrón horizontal en cuadrantes inferiores, consiguiendo la enucleación de la tumoración

MACROSCÓPICAMENTE consistía en una tumoración multilobulada, con áreas quísticas y áreas necróticas de 23x14x11 cms



MICROSCÓPICAMENTE se trataba de un tumor Phyllodes maligno con elementos heterólogos (extensas áreas de osteosarcoma). Presentaba un componente estromal hipercelular, con atipia estromal marcada y abundantes mitosis (índice mitótico: > 10 m/10cga)

Tras la presentación del caso en el Comité de Tumores, se decidió realizar una ampliación de bordes quirúrgicos (mastectomía) y Radioterapia adyuvante

CONCLUSIONES:

Presentamos una rara entidad de tumor Phyllodes maligno, de gran tamaño, y elementos heterólogos con áreas extensas de osteosarcoma



Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Comunidad de Madrid

